

## Fluxograma de vigilância – Sífilis adquirida - CID 10: A53.9

Caso confirmado de sífilis adquirida: Todo indivíduo com evidência clínica de sífilis primária ou secundária (presença de cancro duro ou lesões compatíveis com sífilis secundária), com teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente, OU indivíduo assintomático com teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente. Em ambas as situações sem registro de tratamento prévio.

Preencher notificação, e encaminhar:  
-UBS/ Especialidades/ PA e UPA: VE regionais  
-Hospitais: Programa IST/aids e Hepatites Virais  
(istaidshpatites@guarulhos.sp.gov.br)



Vigilância Epidemiológica regional:

- Inserir dados no SinanNet e REDcap SifAdquirida (em uso no Estado de São Paulo) - <https://redcapcrt.org/surveys/?s=WJ9FMCCTX9P4YJLJ>
- Solicitar controle de cura de todos os casos e inserir no campo observação;

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde : volume unico [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 3a. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019.

Atualizado em 19/01/2024